

NQuIRE® DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES

(Tercera edición, Mayo 2016)

ADICIONAL/DOCUMENTO TÉCNICO

COPYRIGHT:

Este documento puede ser editado, reproducido y publicado en su totalidad, sin que se produzca ninguna modificación, en cualquier formato, incluyendo el electrónico, si es para fines educativos y no comerciales, sin obtenerse el consentimiento o permiso de la Registered Nurses' Association of Ontario, mientras se incluyan los créditos o citación apropiada de todo el material copiado tal y como aparece a continuación:

Registered Nurses' Association of Ontario. NQuIRE® Data Dictionary: Assessment & Management of Pressure Injuries for the Interprofessional Team (Third Ed.). Toronto, ON: Registered Nurses' Association of Ontario; 2016 s

FUENTE - GBP:

Registered Nurses' Association of Ontario. Assessment & Management of Pressure Injuries for the Interprofessional Team (Third Ed.). Toronto, ON: Registered Nurses' Association of Ontario; 2016

AGRADECIMIENTOS:

NQuIRE® y CarEVID® no serían posible sin el compromiso y apoyo de las instituciones que participantes en los Programas Best Practice Spotlight Organizations® (BPSO®) y Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados® (CCEC). La RNAO e Investén-isciii desean agradecer a todas las instituciones que han colaborado y contribuido al desarrollo de NQuIRE® y CarEVID®.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO)
158 Pearl Street
Toronto, Ontario, Canada M5H 1L3
www.rnao.ca

Instituto de Salud Carlos III
Nursing and Healthcare Research Unit
(Investén-isciii)
Monforte de Lemos, 5.
28029, Madrid, Spain
www.isciii.es/investen

GBP Clasificación: 21 – 2 (CCEC)
Fecha de Publicación: Enero 2021

DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES

(Tercera edición, Mayo 2016)

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN:

Hospitales

Atención primaria,

Centros sociosanitarios

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA GUÍA:

Pacientes a partir de 18 años con lesiones por presión (presentes al inicio de los cuidados o desarrolladas durante la prestación de cuidados)

DEFINICIONES:

- “Inicio de los cuidados” se considerará la pauta establecida en la Guía de Valoración y manejo de las lesiones por presión para equipos interprofesionales (RNAO, 2016) para cada recomendación, si no estuviera definido en la Guía, dependiendo del ámbito en el que se presten cuidados, se considerará:
 - El inicio de los cuidados en pacientes hospitalizados, se referirá a la valoración realizada al ingreso
 - El inicio de los cuidados en pacientes que acuden a atención primaria, a consulta o son atendidos en programas de atención (p.ej. pacientes crónicos, atención a personas mayores), se referirá a lo reflejado en la historia clínica en la primera visita que corresponde con el periodo de evaluación (mensual/trimestral, .. según corresponda en la Guía de evaluación).
 - El inicio de los cuidados en pacientes (nuevos) que ingresan en un centro sociosanitario, se referirá a la valoración realizada al ingreso; para pacientes ya ingresados se referirá a los primeros cuidados establecidos en el periodo de evaluación (mensual/trimestral, .. según corresponda en la Guía de evaluación).

Tabla de variables: Véase Anexo II

DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES

(Tercera edición, Mayo 2016)

LP = Lesiones por presión incluyen las categorías I, II, III, IV, no clasificable o tejidos profundos

Inicio de los cuidados=Al ingreso, en la primera visita, comienzo de un nuevo servicio/programa

Requisitos para la recogida de datos=Asegurar que los datos se refieren al mes o trimestre en que la persona ha recibido los cuidados

Para personas con LP múltiples, reportar la peor LP

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos electrónicos y/o en papel

Mejora se refleja como: = Incremento en el porcentaje/ratio = Reducción en el porcentaje/ratio

Nombre del indicador (y código)	Tipo de indicador/ Frecuencia de la recogida de datos	Definición operacional	Cálculo: Descripción	Interpretación
Alineado con el indicador	Recomendación GBP			Elementos de datos
Valoración del riesgo de lesiones por presión (pressinj_pro01_2016)	Indicador de proceso Mensual/trimestral	Porcentaje de personas con LP que han sido valoradas del riesgo de desarrollar LP nuevas	$\frac{\text{Número de personas con LP que han sido valoradas del riesgo de desarrollar LP nuevas}}{\text{Número total de personas con LP}} \times 100$	 n/a
Alineado ^{1,2} Parcialmente alineado ^{3,4,5,6}	1.2			
Valoración de las lesiones por presión nuevas (pressinj_pro02_2016)	Indicador de proceso Mensual/trimestral	Porcentaje de personas con LP nuevas con categorías de II a IV cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados	$\frac{\text{Número de personas con LP nuevas con categorías de II a IV cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados}}{\text{Número total de personas con LP nuevas con categorías de II a IV}} \times 100$	 n/a
Alineado ⁶	1.3			
Valoración de las lesiones por presión nuevas (cat I) (pressinj_pro02_catI_es_2016)	Indicador de proceso Mensual/trimestral	Porcentaje de personas con LP nuevas con categoría I cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados	$\frac{\text{Número de personas con LP nuevas con categoría I cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados}}{\text{Número total de personas con LP nuevas con categoría I}} \times 100$	 n/a
Parcialmente alineado ⁶	1.4			

¹AHRQ = Agency for Healthcare Research and Quality

²Press Ganey NDNQI = National Database of Nursing Quality Indicators

³interRAI = International Resident Assessment Instrument

⁴ICES = Institute of Clinical Evaluative Sciences

⁵CIHI = Canadian Institute for Health Information

⁶RAI-MDS = Resident Assessment Instrument- Minimum Data Set

⁷HQO = Health Quality Ontario

⁸NQF = National Quality Forum

DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES

(Tercera edición, Mayo 2016)

LP = Lesiones por presión incluyen las categorías I, II, III, IV, no clasificable o tejidos profundos

Inicio de los cuidados=Al ingreso, en la primera visita, comienzo de un nuevo servicio/programa

Requisitos para la recogida de datos=Asegurar que los datos se refieren al mes o trimestre en que la persona ha recibido los cuidados

Para personas con LP múltiples, reportar la peor LP

Mejora se refleja como: = Incremento en el porcentaje/ratio = Reducción en el porcentaje/ratio

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos electrónicos y/o en papel

Nombre del indicador (y código)	Tipo de indicador/ Frecuencia de la recogida de datos	Definición operacional	Cálculo: Descripción	Interpretación
Alineado con el indicador	Recomendación GBP			Elementos de datos
Plan de cuidados individualizado para las lesiones por presión (pressinj_pro03_2016)	Indicador de proceso Mensual/trimestral	Porcentaje de personas con LP nuevas o preexistentes con un plan de cuidados individualizado	$\frac{\text{Número de personas con LP nuevas o preexistentes con un plan de cuidados individualizado}}{\text{Número total de personas con LP}} \times 100$	
	2.1-2.2			n/a
Dispositivo de redistribución/descarga de la presión (pressinj_pro04_2016)	Indicador de proceso Mensual/trimestral	Porcentaje de personas con LP que tienen un dispositivo de redistribución/descarga de la presión	$\frac{\text{Número de personas con LP que tienen un dispositivo de redistribución/descarga de la presión}}{\text{Número total de personas con LP}} \times 100$	
	3.2			n/a
Lesiones por presión preexistentes al inicio de los cuidados (pressinj_out01_2016)	Indicadores de resultado Mensual/trimestral	Porcentaje de personas con LP preexistentes al inicio de los cuidados	$\frac{\text{Número de personas con LP preexistentes al inicio de los cuidados}}{\text{Número total de personas al inicio de los cuidados}} \times 100$	
Alineado ⁶	Todas las recomendaciones			n/a

¹AHRQ = Agency for Healthcare Research and Quality

²Press Ganey NDNQI = National Database of Nursing Quality Indicators

³interRAI = International Resident Assessment Instrument

⁴ICES = Institute of Clinical Evaluative Sciences

⁵CIHI = Canadian Institute for Health Information

⁶RAI-MDS = Resident Assessment Instrument- Minimum Data Set

⁷HQO = Health Quality Ontario

⁸NQF = National Quality Forum

DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES

(Tercera edición, Mayo 2016)

LP = Lesiones por presión incluyen las categorías I, II, III, IV, no clasificable o tejidos profundos

Inicio de los cuidados=Al ingreso, en la primera visita, comienzo de un nuevo servicio/programa

Requisitos para la recogida de datos=Asegurar que los datos se refieren al mes o trimestre en que la persona ha recibido los cuidados

Para personas con LP múltiples, reportar la peor LP

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos electrónicos y/o en papel

Mejora se refleja como: ↑ = Incremento en el porcentaje/ratio ↓ = Reducción en el porcentaje/ratio

Nombre del indicador (y código)	Tipo de indicador/ Frecuencia de la recogida de datos	Definición operacional	Cálculo: Descripción	Interpretación
Alineado con el indicador	Recomendación GBP			Elementos de datos
Incidencia de las lesiones por presión (paciente) (pressinj_out02_2016)	Indicadores de resultado Mensual/trimestral	Tasa de personas que desarrollaron una LP nueva por 1000 estancias (días)/visitas-día	$\frac{\text{Número de personas que han desarrollado una LP nueva}}{\text{Número total de estancias (días)/visitas-día de las personas que reciben los cuidados}} \times 1000$ <p><i>Estancias (días) /visitas día es la suma de los días/visitas en los que las personas han recibido los cuidados en el mes/trimestre (según la Guía de evaluación)</i></p>	↓
Parcialmente alineado ^{31,3,5,7,8}	Todas las recomendaciones			n/a
Incidencia de las lesiones por presión (lp) (pressinj_out02_lp_pilot_es_2016)	Indicadores de resultado Mensual/trimestral	Tasa de LP nuevas desarrolladas por 1000 estancias (días) /visitas día	$\frac{\text{Número de LP nuevas en periodo de medición}}{\text{Número total de estancias (días)/visitas día de las personas que reciben los cuidados}} \times 1000$ <p><i>Estancias (días)/visitas día es la suma de los días/visitas en los que las personas han recibido los cuidados en el mes/trimestre (según la Guía de evaluación)</i></p>	↓
Parcialmente alineado ^{31,3,5,7,8}	Todas las recomendaciones			n/a
Empeoramiento de las lesiones por presión (pressinj_out03_2016)	Indicadores de resultado Mensual/trimestral	Porcentaje de personas con LP de categoría de II a IV cuyas lesiones han empeorado	$\frac{\text{Número de personas con LP de categoría de II a IV cuyas lesiones han empeorado}}{\text{Número total de personas con LP de categoría de II a IV que han recibido cuidados}} \times 100$	↓
Alineado ⁵	Todas las recomendaciones			n/a

DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES

(Tercera edición, Mayo 2016)

Nombre del indicador (y código)	Tipo de indicador/ Frecuencia de la recogida de datos	Definición operacional	Cálculo: Descripción	Interpretación
Alineado con el indicador	Recomendación GBP			Elementos de datos
Empeoramiento de las lesiones por presión (cat I) (pressinj_out03_catI_es_2016)	Indicadores de resultado Mensual/trimestral	Porcentaje de personas con LP de categoría de I que ha empeorado	$\frac{\text{Número de personas con LP de categoría I cuyas lesiones han empeorado}}{\text{Número total de personas con LP de categoría I que han recibido cuidados}} \times 100$	 n/a
Parcialmente alineado ⁵	Todas las recomendaciones			n/a
Curación de las lesiones por presión (pressinj_out04_2016)	Indicadores de resultado Mensual/trimestral	Porcentaje de personas con LP con signos de cicatrización entre 2 y 4 semanas	$\frac{\text{Número de personas con LP con signos de cicatrización entre 2 y 4 semanas}}{\text{Número total de personas con LP}} \times 100$	 n/a

¹AHRQ = Agency for Healthcare Research and Quality

²Press Ganey NDNQI = National Database of Nursing Quality Indicators

³interRAI = International Resident Assessment Instrument

⁴ICES = Institute of Clinical Evaluative Sciences

⁵CIHI = Canadian Institute for Health Information

⁶RAI-MDS = Resident Assessment Instrument- Minimum Data Set

⁷HQO = Health Quality Ontario

⁸NQF = National Quality Forum

**NQuIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

Información general	Nombre del indicador (y código)	Valoración del riesgo de lesiones por presión (pressinj_pro01_2016)
	Tipo de indicador	Indicador de proceso
	Recomendación GBP	1.2
	Definición operacional	Porcentaje de personas con LP que han sido valoradas del riesgo de desarrollar LP nuevas
	Categorización	Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores de la salud
	Numerador	Número total de personas con LP que han sido valoradas del riesgo de desarrollar LP nuevas
	Denominador	Número total de personas con LP
	Elementos de datos	n/a
	Criterios de inclusión / exclusión	<p>Las herramientas de valoración del riesgo incluidas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escala de Braden para la predicción del riesgo de úlceras por presión • Escala Norton • Escala Waterlow • Escala de riesgo de úlceras por presión PURS • Emina • Escala Comhon • Otra <p>En la recomendación 1.2 se indica que la valoración del riesgo de lesiones por presión se realizará durante la exploración inicial.</p> <p>* Véase el Anexo H (p. 142-143) de la GBP para más detalles sobre las herramientas de valoración de las LP</p>
	Frecuencia de la recogida de datos	Mensual/Trimestral
Descripción de los cálculos	$\frac{\text{Número de personas con LP que han sido valoradas de desarrollar LP nuevas}}{\text{Número total de personas con LP}} \times 100$	
Interpretación	La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje	
Especificación Técnica	Valores válidos	<ul style="list-style-type: none"> • Numerador ≤ Denominador • Indicador: 0-100%
	Tipo/longitud/formato de los datos	Numérico-limitado a 3 dígitos
	Procedimiento de muestreo	<p>Según Guía de evaluación BPSO España.</p> <p>Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos: Requisitos del tamaño muestral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-25 = 100% • 26-50 = 90% • 51-100 = 80% • 101-200 = 65% • 201-300 = 55% • ≥301 = 50% <p>Método de muestreo recomendado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muestreo aleatorizado estratificado 2. Muestreo aleatorizado simple <p>*Véase la Guía <i>Data Quality & Data Management Guide For BPSOs</i> p. 36-37 para más detalles sobre el muestreo</p>
	Alineado con otros indicadores	<p>Alineado con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press Ganey NDNQI: Valoraciones del riesgo de las lesiones de la piel y por presión al ingreso

**NQUIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

	<ul style="list-style-type: none"> Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ): Porcentaje de ingresados con úlceras por presión cuyo registro médico contiene una valoración integral del paciente y evaluación de la herida exhaustiva <p>Parcialmente alineado con:</p> <ul style="list-style-type: none"> interRAI/Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES)/Canadian Institute for Health Information (CIHI): Escala de riesgo de úlceras por presión (PURS por sus siglas en inglés) / Protocolo de valoración del residente (RAP por sus siglas en inglés) / Protocolo de valoración clínica (CAP por sus siglas en inglés) Instrumento RAI-MDS [Resident Assessment Instrument-Minimum Data Set]: puntuación para la Escala de riesgo de úlceras por presión PURS
Validez	<p><u>Resultados de la validación externa</u></p> <p>Relevancia: n/a Factibilidad: n/a Comprensión: n/a</p> <p>*Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado</p>

**NQuIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

Información general	Nombre del indicador (y código)	Valoración de las lesiones por presión nuevas (pressinj_pro02_2016)
	Tipo de indicador	Indicador de proceso
	Recomendación GBP	1.3
	Definición operacional	Porcentaje de personas con LP nuevas con categorías de II a IV cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados
	Categorización	Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores de la salud
	Numerador	Número de personas con LP nuevas con categorías de II a IV cuyas lesiones han sido valoradas que han sido valoradas al inicio de los cuidados
	Denominador	Número total de personas con LP nuevas con categorías de II a IV
	Elementos de datos	n/a
	Criterios de inclusión / exclusión	<p>La valoración de la LP incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Localización de la lesión • Tamaño de la lesión • Área de la superficie de la herida • Calidad y cantidad de tejido en el lecho de la herida • Integridad de la piel perilesional • Exudado (tipo, cantidad y olor) • Categorías de las LP <p>Nota. La valoración debe realizarse al inicio de los cuidados del paciente si estaba presente o al inicio de los cuidados de la LP cuando se desarrolla.</p> <p>* Véase la p. 37 de la GBP para más detalles sobre la medición y valoración física de las lesiones por presión con categorías de II a IV</p>
	Frecuencia de la recogida de datos	Mensual/Trimestral
Descripción de los cálculos	$\frac{\text{Número de personas con LP nuevas con categorías de II a IV cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados}}{\text{Número total de personas con LP nuevas con categorías de II a IV}} \times 100$	
Interpretación	La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje	
Especificación Técnica	Valores válidos	<ul style="list-style-type: none"> • Numerador ≤ Denominador • Indicador: 0-100%
	Tipo/longitud/formato de los datos	Numérico- limitado a 3 dígitos
	Procedimiento de muestreo	<p>Según Guía de evaluación BPSO España.</p> <p>Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:</p> <p>Requisitos del tamaño muestral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-25 = 100% • 26-50 = 90% • 51-100 = 80% • 101-200 = 65% • 201-300 = 55% • ≥301 = 50% <p>Método de muestreo recomendado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muestreo aleatorizado estratificado 2. Muestreo aleatorizado simple <p>*Véase la Guía <i>Data Quality & Data Management Guide For BPSOs</i> p. 36-37 para más detalles sobre el muestreo</p>
	Alineado con otros indicadores	<p>Alineado con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumento RAI-MDS [Resident Assessment Instrument-Minimum Data Set]: Protocolo de valoración clínica (CAP por sus siglas en inglés)

NQuIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)

Validez	<u>Resultados de la validación externa</u> Relevancia: n/a Factibilidad: n/a Comprensión: n/a *Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**NQuIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

Información general	Nombre del indicador (y código)	Valoración de las lesiones por presión nuevas (cat I) (pressinj_pro02_catI_es_2016)
	Tipo de indicador	Indicador de proceso
	Recomendación GBP	1.3
	Definición operacional	Porcentaje de personas con LP nuevas con categoría I cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados
	Categorización	Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores de la salud
	Numerador	Número de personas con LP nuevas con categoría I cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados
	Denominador	Número total de personas con LP nuevas con categoría I
	Elementos de datos	n/a
	Criterios de inclusión / exclusión	La valoración de la LP incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Localización de la lesión • Tamaño de la lesión si procede • Área de la superficie de la herida • Exudado (tipo, cantidad y olor) si procede • Categorías de las LP <p>Nota. La valoración debe realizarse al inicio de los cuidados del paciente si estaba presente o al inicio de los cuidados de la LP cuando se desarrolla.</p> <p>* Véase la p. 37 de la GBP para más detalles sobre la medición y valoración física de las lesiones por presión</p>
	Frecuencia de la recogida de datos	Mensual/Trimestral
Descripción de los cálculos	$\frac{\text{Número de personas con LP nuevas con categoría I cuyas lesiones han sido valoradas al inicio de los cuidados}}{\text{Número total de personas con LP nuevas con categoría I}} \times 100$	
Interpretación	La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje	
Especificación Técnica	Valores válidos	<ul style="list-style-type: none"> • Numerador ≤ Denominador • Indicador: 0-100%
	Tipo/longitud/formato de los datos	Numérico- limitado a 3 dígitos
	Procedimiento de muestreo	Según Guía de evaluación BPSO España. Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos: Requisitos del tamaño muestral: <ul style="list-style-type: none"> • 0-25 = 100% • 26-50 = 90% • 51-100 = 80% • 101-200 = 65% • 201-300 = 55% • ≥301 = 50% <p>Método de muestreo recomendado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muestreo aleatorizado estratificado 2. Muestreo aleatorizado simple <p>*Véase la Guía <i>Data Quality & Data Management Guide For BPSOs</i> p. 36-37 para más detalles sobre el muestreo</p>
	Alineado con otros indicadores	Parcialmente alineado con: <ul style="list-style-type: none"> • Instrumento RAI-MDS [Resident Assessment Instrument-Minimum Data Set]: Protocolo de valoración clínica (CAP por sus siglas en inglés)
	Validez	<u>Resultados de la validación externa</u> Relevancia: n/a Factibilidad: n/a Comprensión: n/a *Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado

**NQuIRE® DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

Información general	Nombre del indicador (y código)	Plan de cuidados individualizado para las lesiones por presión (pressinj_pro03_2016)
	Tipo de indicador	Indicador de proceso
	Recomendación GBP	2.1-2.2
	Definición operacional	Porcentaje de personas con LP nuevas o preexistentes con un plan de cuidados individualizado
	Categorización	Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores de la salud
	Numerador	Número de personas con LP nuevas o preexistentes con un plan de cuidados individualizado
	Denominador	Número total de personas con lesiones por presión
	Elementos de datos	n/a
	Criterios de inclusión / exclusión	El plan de cuidados individualizado incluye: <ul style="list-style-type: none"> Plan de tratamiento específico para la LP (p.ej. medicación, apósitos) Derivaciones necesarias (p.ej. podólogo, enfermera de práctica avanzada (EPA)/referente en heridas, especialista/referente en control de infecciones, nutricionista, etc.) <p>* Véase la GBP p. 50-54 para más detalles sobre los planes de cuidados de LP individualizados</p>
	Frecuencia de la recogida de datos	Mensual/Trimestral
	Descripción de los cálculos	$\frac{\text{Número de personas con LP nuevas o preexistentes con un plan de cuidados individualizado}}{\text{Número total de personas con LP}} \times 100$
Interpretación	La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje	
Especificación Técnica	Valores válidos	<ul style="list-style-type: none"> Numerador ≤ Denominador Indicador: 0-100%
	Tipo/longitud/formato de los datos	Numérico- limitado a 3 dígitos
	Procedimiento de muestreo	Según Guía de evaluación BPSO España. Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos: Requisitos del tamaño muestral: <ul style="list-style-type: none"> 0-25 = 100% 26-50 = 90% 51-100 = 80% 101-200 = 65% 201-300 = 55% ≥301 = 50% Método de muestreo recomendado: <ol style="list-style-type: none"> Muestreo aleatorizado estratificado Muestreo aleatorizado simple <p>*Véase la Guía <i>Data Quality & Data Management Guide For BPSOs</i> p. 36-37 para más detalles sobre el muestreo</p>
	Alineado con otros indicadores	No alineado
	Validez	<u>Resultados de la validación externa</u> Relevancia: 93% Factibilidad: 64% Comprensión: 86%

**NQuIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

Información general	Nombre del indicador (y código)	Dispositivo de redistribución/descarga de la presión (pressinj_pro04_2016)
	Tipo de indicador	Indicador de proceso
	Recomendación GBP	3.2
	Definición operacional	Porcentaje de personas con LP que tienen un dispositivo de redistribución/descarga de la presión
	Categorización	Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores de la salud
	Numerador	Número de personas con LP que tienen un dispositivo de redistribución/descarga de la presión
	Denominador	Número total de personas con LP
	Elementos de datos	n/a
	Criterios de inclusión / exclusión	<p>Los dispositivos de redistribución/descarga de la presión incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superficie de apoyo reactiva/activa • Sistema integrado en la cama • Accionado/no accionado • Funda • Colchón • Dispositivo de descarga <p>* Véase la GBP p. 57-60 para más detalles sobre los dispositivos de redistribución/descarga de la presión</p>
	Frecuencia de la recogida de datos	Mensual/Trimestral
Especificación Técnica	Descripción de los cálculos	$\frac{\text{Número de personas con LP que tienen un dispositivo de redistribución/descarga de la presión}}{\text{Número total de personas con LP}} \times 100$
	Interpretación	La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje
	Valores válidos	<ul style="list-style-type: none"> • Numerador ≤ Denominador • Indicador: 0-100%
	Tipo/longitud/formato de los datos	Numérico- limitado a 3 dígitos
	Procedimiento de muestreo	<p>Según Guía de evaluación BPSO España.</p> <p>Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos: Requisitos del tamaño muestral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-25 = 100% • 26-50 = 90% • 51-100 = 80% • 101-200 = 65% • 201-300 = 55% • ≥301 = 50% <p>Método de muestreo recomendado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muestreo aleatorizado estratificado 2. Muestreo aleatorizado simple <p>*Véase la Guía <i>Data Quality & Data Management Guide For BPSOs</i> p. 36-37 para más detalles sobre el muestreo</p>
	Alineado con otros indicadores	No alineado
	Validez	<p><u>Resultados de la validación externa</u></p> <p>Relevancia: n/a Factibilidad: n/a Comprensión: n/a</p> <p>*Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado</p>

**NQuIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

Información general	Nombre del indicador (y código)	Lesiones por presión preexistentes al inicio de los cuidados (pressinj_out01_2016)
	Tipo de indicador	Indicador de resultado
	Recomendación GBP	Todas las recomendaciones
	Definición operacional	Porcentaje de personas con LP preexistentes al inicio de los cuidados
	Categorización	Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores de la salud
	Numerador	Número de personas con LP preexistentes al inicio de los cuidados
	Denominador	Número total de personas al inicio de los cuidados
	Elementos de datos	n/a
	Criterios de inclusión / exclusión	Las LP preexistentes incluyen: <ul style="list-style-type: none"> LP de categoría I, II, III, IV, no clasificable o en tejidos profundos <p>* Véase el Anexo E p.135-138 de la GBP para el Sistema de categorización de las lesiones por presión del NPUAP</p>
	Frecuencia de la recogida de datos	Mensual/Trimestral
	Descripción de los cálculos	$\frac{\text{Número de personas con LP preexistentes al inicio de los cuidados}}{\text{Número total de personas al inicio de los cuidados}} \times 100$
Interpretación	La mejora se refleja con una reducción en el porcentaje	
Especificación Técnica	Valores válidos	<ul style="list-style-type: none"> Numerador ≤ Denominador Indicador: 0-100%
	Tipo/longitud/formato de los datos	Numérico- limitado a 3 dígitos
	Procedimiento de muestreo	Según Guía de evaluación BPSO España. Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos: Requisitos del tamaño muestral: <ul style="list-style-type: none"> 0-25 = 100% 26-50 = 90% 51-100 = 80% 101-200 = 65% 201-300 = 55% ≥301 = 50% Método de muestreo recomendado: <ol style="list-style-type: none"> Muestreo aleatorizado estratificado Muestreo aleatorizado simple <p>*Véase la Guía <i>Data Quality & Data Management Guide For BPSOs</i> p. 36-37 para más detalles sobre el muestreo</p>
	Alineado con otros indicadores	Alineado con: <ul style="list-style-type: none"> Instrumento RAI-MDS [Resident Assessment Instrument-Minimum Data Set]: Historial de lesiones por presión previas
	Validez	<u>Resultados de la validación externa</u> Relevancia: 93% Factibilidad: 79% Comprensión: 79%

**NQuIRE[®] DICcionario DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

Información general	Nombre del indicador (y código)	Incidencia de lesiones por presión (pacientes) (pressinj_out02_2016)
	Tipo de indicador	Indicador de resultado
	Recomendación GBP	Todas las recomendaciones
	Definición operacional	Tasa de personas que desarrollaron una LP nueva por 1000 estancias/visitas día
	Categorización	Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores de la salud
	Numerador	Número de personas que han desarrollado una LP nueva
	Denominador	Número total de estancias (días)/visitas día de las personas que reciben los cuidados
	Elementos de datos	n/a
	Criterios de inclusión / exclusión	<p>Las LP nuevas incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cualquier LP desarrollada después del inicio de los cuidados (y desarrollada durante el periodo de evaluación correspondiente (es decir el mes, trimestre, ...según la Guía de evaluación)) • Categorías I, II, III, IV, no clasificable o en tejidos profundos <p>Las estancias se medirán para aquellos pacientes institucionalizados (como unidades hospitalarias, residencias, centros de larga estancia,...). Se calcularán el nº de camas ocupadas por día en la unidad/centro para un periodo de tiempo. Los días de alta/exitus no se incluyen.</p> <p>Las visitas por día se medirán en aquellos servicios ambulatorios, centros de atención primaria, o cuidados a domicilio. Los día visita se medirán en la institución incluyendo las visitas a domicilio, comunitarias, servicios ambulatorios y visitas en centros de atención primaria.</p> <p>* Véase el Anexo E p.135-138 de la GBP para el Sistema de categorización de las lesiones por presión del NPUAP</p>
	Frecuencia de la recogida de datos	Mensual/Trimestral
Descripción de los cálculos	$\frac{\text{Número de personas que han desarrollado una LP nueva}}{\text{Número total de estancias (días)/visitas día de las personas que reciben los cuidados}} \times 1000$ <p><i>Estancias (días)/visitas-día es la suma de los días/visitas en los que las personas han recibido los cuidados en el mes/trimestre (según la Guía de evaluación)</i></p>	
Interpretación	La mejora se refleja con una reducción en la tasa	
Especificación Técnica	Valores válidos	<ul style="list-style-type: none"> • Numerador ≤ Denominador • Indicador: 0-1000
	Tipo/longitud/formato de los datos	Numérico-limitado a 3 dígitos
	Procedimiento de muestreo	<p>Según Guía de evaluación BPSO España.</p> <p>Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos: Requisitos del tamaño muestral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-25 = 100% • 26-50 = 90% • 51-100 = 80% • 101-200 = 65% • 201-300 = 55% • ≥301 = 50% <p>Método de muestreo recomendado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muestreo aleatorizado estratificado 2. Muestreo aleatorizado simple <p>*Véase la Guía <i>Data Quality & Data Management Guide For BPSOs</i> p. 36-37 para más detalles sobre el muestreo</p>

**NQuIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

Alineado con otros indicadores	<p>Parcialmente alineado con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Health Quality Ontario (HQP)/ Canadian Institute for Health Information (CIHI)/interRAI: Porcentaje de los residentes de centros de larga estancia o residencias que desarrollan úlceras por presión de categorías de II a IV; porcentaje de pacientes (residentes) complejos que desarrolla úlceras por presión de categoría II o superior en un periodo de tres meses; porcentaje de pacientes domiciliarios que desarrollan úlceras por presión de categorías II a IV • HQO: Porcentaje de pacientes con nuevas lesiones por presión en un periodo de 6 meses • Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)/National Quality Forum (NQF): Ratio de úlceras por presión cada 1000 altas
Validez	<p><u>Resultados de la validación externa</u> Relevancia: n/a Factibilidad: n/a Comprensión: n/a</p> <p>*Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado</p>

**NQuIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

Información general	Nombre del indicador (y código)	Incidencia de las lesiones por presión (lesiones) (pressinj_out02_lp_pilot_es_2016)
	Tipo de indicador	Indicador de resultado
	Recomendación GBP	Todas las recomendaciones
	Definición operacional	Tasa de evento adverso: LP nuevas por 1000 estancias/visitas día
	Categorización	Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores de la salud
	Numerador	Número de eventos (LP nuevas) en el periodo de medición
	Denominador	Número total de estancias (días)/visitas día de las personas que reciben los cuidados
	Elementos de datos	n/a
	Criterios de inclusión / exclusión	<p>Las LP nuevas incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cualquier LP desarrollada después del inicio de los cuidados (y desarrollada durante el periodo de evaluación correspondiente (es decir el mes, trimestre, ...según la Guía de evaluación)) • Categorías I, II, III, IV, no clasificable o en tejidos profundos <p>Las estancias se medirán para aquellos pacientes institucionalizados (como unidades hospitalarias, residencias, centros de larga estancia,...). Se calcularán el nº de camas ocupada por día en la unidad/centro para un periodo de tiempo. Los días de alta/exitus no se incluyen.</p> <p>Las visitas por día se medirán en aquellos servicios ambulatorios, centros de atención primaria, o cuidados a domicilio. Los días visita se medirán en la institución incluyendo las visitas a domicilio, comunitarias, servicios ambulatorios y visitas en centros de atención primaria.</p> <p>* Véase el Anexo E p.135-138 de la GBP para el Sistema de categorización de las lesiones por presión del NPUAP</p>
	Frecuencia de la recogida de datos	Mensual/Trimestral
Descripción de los cálculos	$\frac{\text{Número de LP nuevas en periodo de medición}}{\text{Número total de estancias (días)/visitas día de las personas que reciben los cuidados}} \times 1000$ <p><i>Estancias (días)/visitas-día es la suma de los días/visitas en los que las personas han recibido los cuidados en el mes/trimestre (según la Guía de evaluación)</i></p>	
Interpretación	La mejora se refleja con una reducción en la tasa	
Especificación Técnica	Valores válidos	<ul style="list-style-type: none"> • Numerador ≤ Denominador • Indicador: 0-1000
	Tipo/longitud/formato de los datos	Numérico-limitado a 3 dígitos
	Procedimiento de muestreo	<p>Según Guía de evaluación BPSO España.</p> <p>Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:</p> <p>Requisitos del tamaño muestral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-25 = 100% • 26-50 = 90% • 51-100 = 80% • 101-200 = 65% • 201-300 = 55% • ≥301 = 50%

**NQuIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

	<p>Método de muestreo recomendado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Muestreo aleatorizado estratificado 4. Muestreo aleatorizado simple <p>*Véase la Guía <i>Data Quality & Data Management Guide For BPSOs</i> p. 36-37 para más detalles sobre el muestreo</p>
Alineado con otros indicadores	<p>Parcialmente alineado con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Health Quality Ontario (HQO)/ Canadian Institute for Health Information (CIHI)/interRAI: Porcentaje de los residentes de centros de larga estancia o residencias que desarrollan úlceras por presión de categorías de II a IV; porcentaje de pacientes (residentes) complejos que desarrolla úlceras por presión de categoría II o superior en un periodo de tres meses; porcentaje de pacientes domiciliarios que desarrollan úlceras por presión de categorías II a IV • HQO: Porcentaje de pacientes con nuevas lesiones por presión en un periodo de 6 meses • Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)/National Quality Forum (NQF): Ratio de úlceras por presión cada 1000 altas
Validez	<p><u>Resultados de la validación externa</u> Relevancia: n/a Factibilidad: n/a Comprensión: n/a</p> <p>*Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado</p>
Nota	<p>Este indicador es de carácter voluntario (se evaluará a criterio del BPSO)</p>

**NQuIRE® DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

Información general	Nombre del indicador (y código)	Empeoramiento de las lesiones por presión (pressinj_out03_2016)
	Tipo de indicador	Indicador de resultado
	Recomendación GBP	Todas las recomendaciones
	Definición operacional	Porcentaje de personas con LP de categoría de II a IV cuyas lesiones han empeorado
	Categorización	Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores de la salud
	Numerador	Número de personas con LP de categoría de II a IV cuyas lesiones han empeorado
	Denominador	Número total de personas con LP de categoría de II a IV que han recibido cuidados
	Elementos de datos	n/a
	Criterios de inclusión / exclusión	<p>Criterios de inclusión:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solo incluir personas con LP con categorías de II a IV Personas con valoraciones válidas después del inicio de los cuidados <p>* Véase el Anexo E p.135-138 de la GBP para el Sistema de categorización de las lesiones por presión del NPUAP</p>
	Frecuencia de la recogida de datos	Mensual/trimestral
	Descripción de los cálculos	$\frac{\text{Número de personas con LP de categoría de II a IV cuyas lesiones han empeorado}}{\text{Número total de personas con LP de categoría de II a IV que han recibido cuidados}} \times 100$
Interpretación	La mejora se refleja con una reducción en el porcentaje	
Especificación Técnica	Valores válidos	<ul style="list-style-type: none"> Numerador ≤ Denominador Indicador: 0-100%
	Tipo/longitud/formato de los datos	Numérico-limitado a 3 dígitos
	Procedimiento de muestreo	<p>Según Guía de evaluación BPSO España.</p> <p>Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:</p> <p>Requisitos del tamaño muestral:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0-25 = 100% 26-50 = 90% 51-100 = 80% 101-200 = 65% 201-300 = 55% ≥301 = 50% <p>Método de muestreo recomendado:</p> <ol style="list-style-type: none"> Muestreo aleatorizado estratificado Muestreo aleatorizado simple <p>*Véase la Guía <i>Data Quality & Data Management Guide For BPSOs</i> p. 36-37 para más detalles sobre el muestreo</p>
	Alineado con otros indicadores	<p>Alineado con:</p> <ul style="list-style-type: none"> CIHI Long-Term Care Indicator: Empeoramiento de las úlceras por presión en cuidados de larga estancia
	Validez	<p><u>Resultados de la validación externa</u></p> <p>Relevancia: 93%</p> <p>Factibilidad: 79%</p> <p>Comprensión: 86%</p>

**NQuIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

Información general	Nombre del indicador (y código)	Empeoramiento de las lesiones por presión (cat I) (pressinj_out03_catI_es_2016)
	Tipo de indicador	Indicador de resultado
	Recomendación GBP	Todas las recomendaciones
	Definición operacional	Porcentaje de personas con LP de categoría I cuyas lesiones han empeorado
	Categorización	Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores de la salud
	Numerador	Número de personas con LP de categoría I cuyas lesiones han empeorado
	Denominador	Número total de personas con LP de categoría I que han recibido cuidados
	Elementos de datos	n/a
	Criterios de inclusión / exclusión	Criterios de inclusión: <ul style="list-style-type: none"> Solo incluir personas con LP con categoría I Personas con valoraciones válidas después del inicio de los cuidados <p>* Véase el Anexo E p.135-138 de la GBP para el Sistema de categorización de las lesiones por presión del NPUAP</p>
	Frecuencia de la recogida de datos	Mensual/trimestral
Especificación Técnica	Descripción de los cálculos	$\frac{\text{Número de personas con LP de categoría I cuyas lesiones han empeorado}}{\text{Número total de personas con LP de categoría I que han recibido cuidados}} \times 100$
	Interpretación	La mejora se refleja con una reducción en el porcentaje
	Valores válidos	<ul style="list-style-type: none"> Numerador ≤ Denominador Indicador: 0-100%
	Tipo/longitud/formato de los datos	Numérico-limitado a 3 dígitos
	Procedimiento de muestreo	Según Guía de evaluación BPSO España. Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos: Requisitos del tamaño muestral: <ul style="list-style-type: none"> 0-25 = 100% 26-50 = 90% 51-100 = 80% 101-200 = 65% 201-300 = 55% ≥301 = 50% Método de muestreo recomendado: <ol style="list-style-type: none"> Muestreo aleatorizado estratificado Muestreo aleatorizado simple <p>*Véase la Guía <i>Data Quality & Data Management Guide For BPSOs</i> p. 36-37 para más detalles sobre el muestreo</p>
	Alineado con otros indicadores	Alineado con: <ul style="list-style-type: none"> CIHI Long-Term Care Indicator: Empeoramiento de las úlceras por presión en cuidados de larga estancia
	Validez	<u>Resultados de la validación externa</u> Relevancia: 93% Factibilidad: 79% Comprensión: 86%

**NQuIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

Información general	Nombre del indicador (y código)	Cicatrización de las lesiones por presión (pressinj_out04_2016)
	Tipo de indicador	Indicador de resultado
	Recomendación GBP	Todas las recomendaciones
	Definición operacional	Porcentaje de personas con LP con signos de cicatrización entre 2 y 4 semanas
	Categorización	Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes sectores de la salud
	Numerador	Número de personas con LP con signos de cicatrización entre 2 y 4 semanas
	Denominador	Número total de personas con LP
	Elementos de datos	n/a
	Criterios de inclusión / exclusión	Incluir solo personas que reciban cuidados en el periodo de medición Las herramientas de valoración de las LP incluyen: <ul style="list-style-type: none"> • Escala PUSH (Pressure Ulcer Scale for Healing) • Escala fotográfica PWAT (Photographic Wound Assessment Tool) • Escala de Bates-Jensen (Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT)) • Escala Resvech 2.0: instrumento de monitorización clínica y medida de la cicatrización en lesiones por presión ** • Otra <p>* Véase el Anexo I p.144-148 de la GBP para más detalles sobre las herramientas de valoración de las LP</p> <p>** Restrepo Medrano, JC. Instrumentos de monitorización clínica y medida de la cicatrización en úlceras por presión (UPP) y úlceras de la extremidad inferior (UEI). Desarrollo y validación de un índice de medida [Tesis]. [Alicante]: Universidad de Alicante; 2010. Disponible en: https://gneaupp.info/wp-content/uploads/2014/12/40_pdf.pdf</p>
	Frecuencia de la recogida de datos	Mensual/trimestral
Descripción de los cálculos	$\frac{\text{Número de personas con LP con signos de cicatrización entre 2 y 4 semanas}}{\text{Número total de personas con LP}} \times 100$	
Interpretación	La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje	
Especificación Técnica	Valores válidos	<ul style="list-style-type: none"> • Numerador ≤ Denominador • Indicador: 0-100%
	Tipo/longitud/formato de los datos	Numérico-limitado a 3 dígitos
	Procedimiento de muestreo	Según Guía de evaluación BPSO España. Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos: Requisitos del tamaño muestral: <ul style="list-style-type: none"> • 0-25 = 100% • 26-50 = 90% • 51-100 = 80% • 101-200 = 65% • 201-300 = 55% • ≥301 = 50% <p>Método de muestreo recomendado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muestreo aleatorizado estratificado 2. Muestreo aleatorizado simple <p>*Véase la Guía <i>Data Quality & Data Management Guide For BPSOs</i> p. 36-37 para más detalles sobre el muestreo</p>

**NQUIRE[®] DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES
POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)**

	Alineado con otros indicadores	No alineado
	Validez	<u>Resultados de la validación externa</u> Relevancia: n/a Factibilidad: n/a Comprensión: n/a *Basado en los resultados de la validación externa, el indicador fue modificado

NQUIRE® DICCIONARIO DE DATOS: VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS LESIONES POR PRESIÓN PARA EQUIPOS INTERPROFESIONALES
(Tercera edición, Mayo 2016)

[02_2016] LESIONES POR PRESIÓN – MANEJO (Nuevo formulario desde enero 2021)
(Valoración y manejo de las lesiones por presión para equipos interprofesionales)

Consideraciones específicas de la guía:

- Criterio de selección: El objetivo de esta Guía es el de ofrecer recomendaciones basadas en la evidencia aplicables para la toma de decisiones y la práctica clínica de los equipos interdisciplinarios ocupados de la valoración y el manejo de las lesiones por presión de pacientes a partir de 18 años.
- Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador, en el caso de la prevención de lesiones por presión es opcional. Sólo en caso de que se repita un mismo paciente en varias unidades relativas a la misma medición mensual, se indicará en este código interno.
- El inicio de los cuidados coincide con la apertura del episodio (en atención primaria el inicio de los cuidados puede no estar asociado directamente a cada consulta/visita, ya que puede haber varias consultas/visitas que estén asociados a un mismo cuidado)

Tabla de variables de la guía formulario [02_2016] LESIONES POR PRESIÓN – MANEJO

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE	TIPO VARIABLE	VALOR	CONDICIONES	INDICADOR
Datos generales				
(pressinj_event_date_2016) Fecha a la que se refiere la recogida de datos (día de alta / visita, etc.)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Fecha <= Hoy		Información adicional
Datos sociodemográficos				
(OPCIONAL) (pressinj_cod_interno_2016) Código asignado por el evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá contener datos identificativos del paciente	Texto			
(pressinj_genre_2016) Género	Lista valor único	0=Masculino; 1=Femenino;		Información adicional
(pressinj_age_2016) Edad	Numérico entero	[18..130]		Información adicional
Datos de proceso				
(pressinj_pro01_2016_num) Indique si se ha valorado el riesgo de desarrollar lesiones por presión nuevas Nota. La valoración del riesgo de desarrollar lesiones por presión nuevas se realizará durante la exploración inicial	Lista de valor único	0=No; 1=Sí; -1=No aplicable;		pressinj_pro01_2016 (numerador)
(na_pressinj_pro01_2016_num) En caso de que [pressinj_pro01_2016_num] sea no aplicable indicar el/los motivo/s	Lista valor múltiple	Nota ¹	pressinj_pro01_2016_num=-1	Información adicional
(pressinj_pro01_tool_2016) Indique la herramienta utilizada en la valoración del riesgo de desarrollar lesiones por presión nuevas	Lista de valor único	1=Braden; 2=Norton; 3=Waterlow; 4=Emina; 5=Escala Comhon; 888=Otro; -1=No aplicable;	pressinj_pro01_2016_num=1	Información adicional
(pressinj_pro02_2016_num) Indique si se han valorado las lesiones por presión nuevas con categorías de II a IV al inicio de los cuidados	Lista de valor único	0=No; 1=Sí; -1=No aplicable;		pressinj_pro02_2016 (numerador)
(na_pressinj_pro02_2016_num) En caso de que [pressinj_pro02_2016_num] sea no aplicable indicar el/los motivo/s	Lista valor múltiple	Nota ¹	pressinj_pro02_2016_num=-1	Información adicional

(pressinj_pro02_catl_es_2016_num) Indique si se han valorado las lesiones por presión nuevas con categoría I al inicio de los cuidados	Lista de valor único	0=No; 1=Sí; -1=No aplicable;		pressinj_pro02_catl_es_2016 (numerador)
(na_pressinj_pro02_catl_es_2016_num) En caso de que [pressinj_pro02_catl_es_2016_num] sea no aplicable indicar el/los motivo/s	Lista valor múltiple	Nota ¹	pressinj_pro02_catl_es_2016_num=-1	Información adicional
(pressinj_pro03_2016_num) Indique si la persona con lesiones por presión nuevas o preexistentes tiene un plan de cuidados individualizado	Lista de valor único	0=No; 1=Sí; -1=No aplicable;		pressinj_pro03_2016 (numerador)
(na_pressinj_pro03_2016_num) En caso de que [pressinj_pro03_2016_num] sea no aplicable indicar el/los motivo/s	Lista valor múltiple	Nota ¹	pressinj_pro03_2016_num=-1	Información adicional
(pressinj_pro04_2016_num) Indique si la persona con lesiones por presión tiene un dispositivo de redistribución/descarga de la presión	Lista de valor único	0=No; 1=Sí; -1=No aplicable;		pressinj_pro04_2016 (numerador)
(na_pressinj_pro04_2016_num) En caso de que [pressinj_pro04_2016_num] sea no aplicable indicar el/los motivo/s	Lista valor múltiple	Nota ¹	pressinj_pro04_2016_num=-1	Información adicional
Datos de resultado				
(pressinj_out01_2016_num) Indique si la persona tenía una lesión por presión preexistente al inicio de los cuidados	Lista de valor único	0=No; 1=Sí; -1=No aplicable;		pressinj_out01_2016 (numerador)
(pressinj_out01_cat_2016_num) Indique las categorías de las lesiones por presión preexistentes al inicio de los cuidados	Lista de valor múltiple	1=Categoría I; 2=Categoría II; 3=Categoría III; 4=Categoría IV; 5=No clasificable (profundidad desconocida); 6=Lesión por presión en tejidos profundos; -1=No aplicable;	pressinj_out01_2016_num=1	Información adicional

<p>(pressinj_out02_2016_num) Indique si la persona desarrolló alguna lesión por presión nueva durante el periodo de medición</p> <p>Nota: Se considerará que la persona ha desarrollado una lesión por presión nueva si se ha desarrollado después del inicio de los cuidados y durante el periodo de evaluación correspondiente (es decir el mes, trimestre,... según la Guía de evaluación)</p>	Lista de valor único	0=No; 1=Sí; -1=No aplicable;		pressinj_out02_2016 (numerador)
<p>(pressinj_out02_caredays_2016_denom) (INCIDENCIA POR PACIENTE) Indique la suma de los días (estancias) en los que la persona ha recibido los cuidados en el periodo de medición (si aplica en su ámbito)</p> <p>Nota: Se contabilizará la estancia completa para los que no hayan desarrollado nuevas lesiones por presión durante toda la estancia y para los que hayan desarrollado lesiones por presión nuevas <u>hasta el día que se produzca la primera lesión por presión</u> (independientemente de si se han producido una o varias).</p> <p>El periodo de evaluación será el mes/trimestre... (según la Guía de evaluación). Si la prestación de cuidados es mayor que el periodo de evaluación solo contabilizará los días correspondientes al periodo de evaluación.</p>	Numérico	>=0		pressinj_out02_2016 pressinj_out02_lp_pilot_es_2016_num (denominador)
<p>(pressinj_out02_visits_2016_denom) (INCIDENCIA POR PACIENTE) Indique la suma de las visitas en las que la persona ha recibido los cuidados en el periodo de medición (si aplica en su ámbito)</p> <p>Nota: Se contabilizarán todas las visitas para los que no hayan desarrollado lesiones por presión nuevas durante todo el periodo de medición y para los que hayan desarrollado nuevas lesiones por presión <u>hasta el día que se produzca la primera lesión por presión nueva</u> (independientemente de si se han producido una o varias).</p> <p>El periodo de evaluación será el mes/trimestre... (según la Guía de evaluación). Si la prestación de cuidados es mayor que el periodo de evaluación solo contabilizará los días correspondientes al periodo de evaluación.</p>	Numérico	>=0		pressinj_out02_2016 pressinj_out02_lp_pilot_es_2016_num (denominador)

<p>(pressinj_out02_lp_pilot_es_2016_num) Indique el número de lesiones por presión nuevas desarrolladas durante el periodo de medición</p> <p>Nota: Se considerará que la persona ha desarrollado una lesión por presión nueva si se ha desarrollado después del inicio de los cuidados y durante el periodo de evaluación correspondiente (es decir el mes, trimestre,... según la Guía de evaluación).</p> <p>En el caso de que la persona no haya desarrollado lesiones nuevas, es necesario indicar "0"</p> <p>Si no dispone del dato o es no aplicable indicar "no dispongo del dato".</p>	Numérico	>=0	pressinj_out02_2016_num=1	pressinj_out02_lp_pilot_es_2016 (numerador)
<p>(pressinj_out02_caredays_lp_pilot_es_2016_denom) (INCIDENCIA POR LESIÓN) Indique la suma de los días (estancias) en los que la persona ha recibido los cuidados en el periodo de medición (si aplica en su ámbito)</p> <p>Nota: Se contabilizará la estancia completa para los que no hayan desarrollado nuevas lesiones por presión durante toda la estancia y para los que hayan desarrollado lesiones por presión nuevas <u>hasta el día que se produzca la última lesión por presión.</u></p> <p>El periodo de evaluación será el mes/trimestre... (según la Guía de evaluación). Si la prestación de cuidados es mayor que el periodo de evaluación solo contabilizará los días correspondientes al periodo de evaluación.</p>	Numérico	>=0		pressinj_out02_2016 pressinj_out02_lp_pilot_es_2016_num (denominador)
<p>(pressinj_out02_visits_lp_pilot_es_2016_denom) (INCIDENCIA POR LESIÓN) Indique la suma de las visitas en las que la persona ha recibido los cuidados en el periodo de medición (si aplica en su ámbito)</p> <p>Nota: Se contabilizaran todas las visitas para los que no hayan desarrollado nuevas lesiones por presión durante toda la estancia y para los que hayan desarrollado lesiones por presión nuevas <u>hasta el día que se produzca la última lesión por presión.</u></p>	Numérico	>=0		pressinj_out02_2016 pressinj_out02_lp_pilot_es_2016_num (denominador)

El periodo de evaluación será el mes/trimestre... (según la Guía de evaluación). Si la prestación de cuidados es mayor que el periodo de evaluación solo contabilizará las visitas correspondientes al periodo de evaluación.				
(pressinj_out02_cat_2016_num) Indique las categorías de las lesiones nuevas desarrolladas durante la prestación de cuidados	Lista de valor múltiple	1=Categoría I; 2=Categoría II; 3=Categoría III; 4=Categoría IV; 5=No clasificable (profundidad desconocida); 6=Lesión por presión en tejidos profundos; -1=No aplicable;	pressinj_out02_2016_num=1	Información adicional
(pressinj_out03_2016_num) Indique si la persona tenía una lesión por presión de categoría II a IV que ha empeorado	Lista de valor único	0=No; 1=Sí; -1=No aplicable;		pressinj_pro03_2016 (numerador)
(pressinj_out03_catI_es_2016_num) Indique si la persona tenía una lesión por presión de categoría I que ha empeorado	Lista de valor único	0=No; 1=Sí; -1=No aplicable;		pressinj_pro03_catI_es_2016 (numerador)
(pressinj_out04_2016) Indique si la persona con lesión/es por presión tuvo signos de cicatrización entre 2 y 4 semanas	Lista de valor único	0=No; 1=Sí; -1=No aplicable;		pressinj_out04_2016 (numerador)
(pressinj_out04_tool_2016) Indique la herramienta utilizada para evaluar los signos de cicatrización	Lista de valor múltiple	1= Escala PUSH; 2= Escala fotográfica PWAT; 3= Escala de Bates-Jensen; 4= Escala Resvech; 888= Otro; -1=No aplicable		Información adicional

Nota¹. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /888=Otro.